

**(1994-
2024)**

30 años de la
Consagración Constitucional
de la Autonomía y Autarquía
Universitaria en Argentina.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS HÍDRICAS

ESTADÍSTICA (I.I.)

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA (I.I.A.)

TABLAS RESUMEN DE INFERENCIA DISTRIBUCIÓN EN EL MUESTREO E INTERVALOS DE CONFIANZA

Responsable de cátedra: Prof. Juan Pablo Taulamet

Carreras: Ingeniería en Informática - Ingeniería en Inteligencia Artificial

Equipo de cátedra: *Auxiliares:* Lic. María José Llop (J.T.P.) - Ing. Franco Nardi (Ay.1°)

Ayudantes: A.I.A. Cristian Bottazzi - Téc. Eliana García

AÑO ACADÉMICO 2024 – PRIMER CUATRIMESTRE

Parámetro	Supuesto	Estimador	Distribución del estimador	Intervalo de confianza
μ	σ conocido	\bar{x}	$\bar{x} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} \pm Z_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$
μ	σ desconocido, $n > 30$	\bar{x}	$\bar{x} \sim N\left(\mu, \frac{S}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} \pm Z_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)} \frac{S}{\sqrt{n}}\right)$
μ	σ desconocido, $n < 30$	\bar{x}	$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{S'}{\sqrt{n}}} = t_{(n-1)}$	$\left(\bar{x} \pm t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}, n-1\right)} \frac{S'}{\sqrt{n}}\right)$
σ^2	Población normal	S^2	$\frac{n \cdot S^2}{\sigma^2} = \chi^2_{(n-1)}$ ó $\frac{(n-1) \cdot S'^2}{\sigma^2} = \chi^2_{(n-1)}$	$\left(\frac{n \cdot S^2}{\chi^2_{\left(1-\frac{\alpha}{2}, n-1\right)}} \leq \sigma^2 \leq \frac{n \cdot S^2}{\chi^2_{\left(\frac{\alpha}{2}, n-1\right)}}\right)$
π	Población normal	p	$Z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}}$	$\left(p \pm Z_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)} \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}\right)$
$\mu_x - \mu_y$	σ_x, σ_y conocidas	$\bar{x} - \bar{y}$	$\bar{x} - \bar{y} \sim N\left(\mu_x - \mu_y, \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}\right)$	$\left((\bar{x} - \bar{y}) \pm Z_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)} \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}\right)$
$\mu_x - \mu_y$	σ_x, σ_y desconocidas $n > 30$	$\bar{x} - \bar{y}$	$\bar{x} - \bar{y} \sim N\left(\mu_x - \mu_y, \sqrt{\frac{S_x^2}{n_x} + \frac{S_y^2}{n_y}}\right)$	$\left((\bar{x} - \bar{y}) \pm Z_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)} \sqrt{\frac{S_x^2}{n_x} + \frac{S_y^2}{n_y}}\right)$

$\mu_x - \mu_y$	σ_x, σ_y desconocidas pero iguales $n < 30$	$\bar{x} - \bar{y}$	$\frac{\bar{x} - \bar{y} - (\mu_x - \mu_y)}{S_w \cdot \sqrt{\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y}}} = t_{(n_x+n_y-2)}$ $\text{con } S_w = \sqrt{\frac{(n_x-1) \cdot S_x^2 + (n_y-1) \cdot S_y^2}{n_x + n_y - 2}}$ $\text{ó con } S_w = \sqrt{\frac{n_x \cdot S_x^2 + n_y \cdot S_y^2}{n_x + n_y - 2}}$	$\left((\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot S_w \cdot \sqrt{\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y}} \right)$
$\mu_x - \mu_y$	σ_x, σ_y desconocidas y distintas $n < 30$	$\bar{x} - \bar{y}$	$\frac{\bar{x} - \bar{y} - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{S_x^2}{n_x} + \frac{S_y^2}{n_y}}} = t_v$ $\text{con } v = \frac{\left(\frac{S_x^2}{n_x} + \frac{S_y^2}{n_y}\right)^2}{\left(\frac{S_x^2}{n_x}\right)^2 + \left(\frac{S_y^2}{n_y}\right)^2} - 2$	$\left((\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{\left(\frac{\alpha}{2}\right), v} \cdot \sqrt{\frac{S_x^2}{n_x} + \frac{S_y^2}{n_y}} \right)$
$\pi_1 - \pi_2$	Poblaciones normales	$p_1 - p_2$	$p_1 - p_2 \sim N \left(\pi_1 - \pi_2, \sqrt{\frac{\pi_1(1-\pi_1)}{n_1} + \frac{\pi_2(1-\pi_2)}{n_2}} \right)$	$\left(\Delta p \pm Z_{\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot (I) \right)$ $(I) = \sqrt{\frac{\pi_1(1-\pi_1)}{n_1} + \frac{\pi_2(1-\pi_2)}{n_2}}$
σ_x^2 σ_y^2	Poblaciones normales	$\frac{S_x^2}{S_y^2}$	$F = \frac{\frac{S_x^2}{\sigma_x^2}}{\frac{S_y^2}{\sigma_y^2}}$	$\left(\frac{S_x^2}{S_y^2} (I) \leq \frac{\sigma_x^2}{\sigma_y^2} \leq \frac{S_x^2}{S_y^2} (II) \right)$ $(I) = F_{\left(\frac{\alpha}{2}, n_x-1, n_y-1\right)} \quad (II) = F_{\left(\frac{\alpha}{2}, n_y-1, n_x-1\right)}$

Parámetro	Supuesto	Estimador	Distribución del estimador	Intervalo de confianza
α	Población Normal	a	$a \sim N \left(\alpha, \sqrt{\left[\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right]} \right)$	$a \pm Z_{\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)} \sqrt{\left[\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right]} \sigma^2$
β	Población Normal	b	$b \sim N \left(\beta, \sqrt{\frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}} \right)$	$b \pm Z_{\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)} \sqrt{\frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$

Varianza de la Predicción	Varianza del Pronóstico
$\sigma^2(\hat{Y}_h) = \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{(X_h - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \right]$	$\sigma^2(Y_i - \hat{Y}_h) = \sigma^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_h - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \right]$

Intervalo para la Predicción	Intervalo para el Pronóstico
$\left(\hat{Y}_h \pm t_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}} \hat{\sigma}_{pred} \right)$ $\hat{\sigma}_{pred} = \hat{S}_{y/x} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_h - \bar{x})^2}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}}$	$\left(\hat{Y}_h \pm t_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}} \hat{\sigma}_{pron} \right)$ $\hat{\sigma}_{pron} = \hat{S}_{y/x} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_h - \bar{X})^2}{\sum_i (X_i - \bar{X})^2}}$